

Prise des comprimés d'avortement pendant les 12 premières semaines qui suivent les dernières règles

MISOPROSTOL PLACÉ À L'INTÉRIEUR DES JOUES

Est-ce que je peux utiliser ces comprimés ?



Si vous êtes enceinte de moins de 12 semaines, vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous êtes enceinte de plus de 10 semaines il est peut-être préférable pour vous de prendre les comprimés de misoprostol dans un établissement de santé. Si cela fait plus de 12 semaines depuis vos dernières règles, il se peut que cette méthode ne fonctionne pas pour vous.

Comment dois-je prendre les comprimés ?

Placez 2 comprimés (misoprostol) entre la joue et la gencive inférieure de chaque côté de votre bouche (4 comprimés au total) et gardez-les en place jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Après 30 minutes, avaler ce qui reste dans la bouche avec de l'eau.


Continuez à prendre d'autres comprimés de la même manière toutes les 3 heures, jusqu'à un total de 12 comprimés.

Pour réduire la douleur et les crampes, prenez de l'ibuprofène avant ou juste après avoir pris les 4 premiers comprimés.



Que va-t-il se passer lorsque j'aurai pris les comprimés ?

Les comprimés doivent provoquer des saignements et des crampes et il se peut que vous observiez des caillots sanguins. Les saignements peuvent être plus abondants que vos règles habituelles. Chaque femme ressentira différemment les saignements et les crampes.



SAIGNEMENTS



CRAMPES

Vous aurez peut-être des effets indésirables

La plupart des effets indésirables, lorsqu'ils se produisent, disparaissent en quelques heures. Si un effet indésirable se poursuit au-delà d'une journée, consultez la professionnelle de santé la plus proche.


VOMISSEMENTS



MAUX DE TÊTE



FIÈVRE / FRISSONS






DIARRHÉE



Quand dois-je obtenir de l'aide ?

Si vous avez l'un des symptômes suivants, consultez une professionnelle de santé pour obtenir des soins supplémentaires :




- Des saignements abondants, plus de 2 serviettes périodiques imbibées par heure pendant 2 heures consécutives, particulièrement si vous avez la tête qui tourne, des sensations de vertige et que vous vous sentez de plus en plus fatiguée.
- Des pertes vaginales inhabituelles ou malodorantes, particulièrement si vous avez des crampes intenses ou des douleurs abdominales.
- N'importe lequel des symptômes suivants le lendemain du jour où vous avez pris 4 comprimés de misoprostol :
 - o Fièvre
 - o Douleurs intenses dans le ventre
 - o Se sentir malade avec ou sans fièvre
 - o Nausées ou vomissements persistants

Comment vais-je savoir si les comprimés ont fonctionné ?

Si vous avez eu des saignements et des crampes et que vous n'avez plus l'impression d'être enceinte, cela veut probablement dire que les comprimés ont fonctionné.

Si vous n'avez plus de saignements ou seulement des saignements légers 4 à 5 jours après avoir pris les 4 comprimés, cela peut vouloir dire que les comprimés n'ont pas fonctionné et que vous êtes peut-être encore enceinte. Cela arrive à environ 15 femmes sur 100. Pour en être certaine, vous devez consulter la professionnelle de santé la plus proche et obtenir de l'aide.




Quand puis-je avoir à nouveau des rapports sexuels ?

Vous pouvez avoir des rapports sexuels aussi rapidement que vous le souhaitez.

Quand est-ce que je risque d'être enceinte à nouveau ?

Vous pouvez être enceinte à nouveau dès 8 jours après l'avortement.



Comment puis-je ÉVITER d'être enceinte à nouveau ?

Si vous ne voulez pas être enceinte, utilisez une méthode de contraception. Parlez de contraception avec votre professionnelle de santé. Vous pouvez initier la plupart des méthodes de contraception en même temps que vous prenez les comprimés d'avortement.

Appelez ce numéro si vous avez des questions :

Pour d'autres ressources comme celle-ci, consultez : www.ipas.org/HumanitarianResources