

Unidad de salud sin AMEU

Tamaño uterino \leq 12 semanas FUM
Administrar misoprostol*

Remitir a las mujeres que presentan cuadro clínico inestable o complicaciones graves

Si el manejo médico fracasa y la mujer presenta cuadro clínico estable

Manejo expectante
○
Repetir la dosis de misoprostol

REMITIR SI ES NECESARIO

Unidad de salud con AMEU

Tamaño uterino \leq 12 semanas FUM
Administrar misoprostol*

Tamaño uterino $>$ 12 semanas FUM
Realizar la AMEU o remitir para el Tratamiento de complicaciones graves

Si el manejo médico fracasa y la mujer presenta cuadro clínico estable

Manejo expectante
○
Repetir la dosis de misoprostol
○
Realizar la AMEU

REMITIR SI ES NECESARIO

Unidad de referencia

Tamaño uterino \leq 12 semanas FUM
Administrar misoprostol*

Tamaño uterino $>$ 12 semanas FUM
Realizar la AMEU u otro método de evacuación endouterina, u otros procedimientos quirúrgicos para tratar las complicaciones según sea necesario

Si el manejo médico fracasa y la mujer presenta cuadro clínico estable

Manejo expectante
○
Repetir la dosis de misoprostol
○
Realizar la AMEU

Consejería anticonceptiva y suministro de un método anticonceptivo