

INDICACIONES Y RÉGIMENES PARA EL USO DE MISOPROSTOL

ABORTO INCOMPLETO

Dosis de misoprostol	Vía	Momento oportuno
600 mcg	Oral	Tres tabletas de 200 mcg tomadas a la vez (dosis única)
○ 400 mcg	Sublingual	Dos tabletas de 200 mcg colocadas debajo de la lengua hasta que se disuelvan o durante 30 minutos; se debe tragar todo fragmento restante. (Dosis única)

ABORTO DIFERIDO/HUEVO ANEMBRIONADO

Dosis de misoprostol	Vía	Momento oportuno
800 mcg	Vaginal	Dosis única
○ 600 mcg	Sublingual	Administrar cada 3 horas para un máximo de 3 dosis ○ Dosis única*

* El misoprostol por vía sublingual, 600 mcg cada 3 horas para un máximo de 3 dosis, es un régimen recomendado; también se puede utilizar una dosis única de 600 mcg de misoprostol por vía sublingual si no se logra el efecto esperado durante 1 ó 2 semanas (a menos que la mujer presente sangrado abundante o infección).

PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA POSPARTO

Dosis de misoprostol	Vía	Momento oportuno
600 mcg	Oral	Se debe tomar inmediatamente después del parto de un recién nacido. Excluir la presencia de un segundo feto (gemelo) antes de la administración.

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO (≥ 500 ml PÉRDIDA DE SANGRE)

Se deben utilizar oxitócicos convencionales

Dosis de misoprostol	Vía	Momento oportuno
800 mcg	Sublingual	INMEDIATO
O 1000 mcg	Rectal	INMEDIATO

INDUCCIÓN DEL PARTO

Precaución con cesárea anterior

Dosis de misoprostol	Vía	Momento oportuno
25 mcg	Vaginal	Cada 4 horas (hasta 6 dosis con monitoreo cuidadoso)
O 20 mcg (disolver 1 tableta de 200 mcg en un frasco con 200 ml de agua limpia. Administrar 20 ml por dosis)	Oral	Cada 2 horas (hasta 12 dosis con monitoreo cuidadoso). Agite bien la solución en el frasco antes de cada dosis. Deseche el frasco después de 24 horas.