

GUÍA DE BOLSILLO SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Para personal de salud

MÉTODO ANTICONCEPTIVO	CUÁNDO SE PUEDE OFRECER EL MÉTODO	NOTAS
Condomes	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar como un método provisional: para mujeres que no pueden decidirse en cuanto a un anticonceptivo, o a quienes no se les puede ofrecer el método que eligieron inmediatamente después del tratamiento del aborto incompleto.
Inyectables	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar aun cuando la mujer presenta infección.
Anticonceptivos orales	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar aun cuando la mujer presenta infección.
Dispositivo intrauterino	En la cita de control	Asegurarse de que el tratamiento tuvo éxito; no se debe utilizar en presencia de una infección activa. Suministrar condones u otros métodos temporales hasta la cita de control.

Implantes	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar aun cuando la mujer presenta infección.
Esterilización	En la cita de control	Suministrar condones u otros métodos temporales hasta la cita de control.
Diafragma	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Considerar cambiar de tamaño según la edad gestacional.
Jaleas, espumas, tabletas o películas anticonceptivas	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar aun cuando la mujer presenta infección.
Parches dérmicos	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar aun cuando la mujer presenta infección.
Anillo vaginal	Inmediatamente en la misma consulta de APA	Se puede utilizar aun cuando la mujer presenta infección.
Píldoras anticonceptivas de emergencia	En cualquier momento	Suministrar las píldoras anticonceptivas de emergencia de antemano como método de respaldo.