

Institution de soins de santé sans AMIU

Taille utérine ≤ 12 semaines depuis la date des dernières règles
Administer du misoprostol*

Référer les patientes cliniquement instables ou celles qui présentent des complications graves

En cas d'échec de la prise en charge et si la patiente est cliniquement stable

Prise en charge attentiste
OU
Répétition de l'administration de misoprostol

RÉFÉRER LA PATIENTE SI NÉCESSAIRE

Institution de soins de santé avec AMIU

Taille utérine ≤ 12 semaines depuis la date des dernières règles
Administer du misoprostol*

Taille utérine > 12 semaines depuis la date des dernières règles
AMIU ou référer la patiente en cas de complications graves

En cas d'échec de la prise en charge et si la patiente est cliniquement stable

Prise en charge attentiste
OU
Répétition de l'administration de misoprostol
OU
Traitement par AMIU

RÉFÉRER LA PATIENTE SI NÉCESSAIRE

Institution de référence

Taille utérine ≤ 12 semaines depuis la date des dernières règles
Administer du misoprostol*

Taille utérine > 12 semaines depuis la date des dernières règles
AMIU ou autre méthode d'évacuation utérine, intervention chirurgicale ou autres procédures visant à traiter les complications le cas échéant

En cas d'échec de la prise en charge et si la patiente est cliniquement stable

Prise en charge attentiste
OU
Répétition de l'administration de misoprostol
OU
Traitement par AMIU

Conseil en matière de contraception et fourniture d'une méthode contraceptive