

INDICATIONS ET SCHÉMAS D'ADMINISTRATION POUR L'UTILISATION DU MISOPROSTOL

AVORTEMENT INCOMPLET

Dose de misoprostol	Voie	Moment
600 µg	Orale	Trois comprimés à 200 µg à prendre en une fois (dose unique)
OU 400 µg	Sublinguale	Deux comprimés à 200 µg à laisser sous la langue jusqu'à dissolution ou pendant 30 minutes ; avaler les fragments restants. (dose unique)

GROSSESSE ARRÊTÉE / GROSSESSE SANS EMBRYON

Dose de misoprostol	Voie	Moment
800 µg	Vaginale	Dose unique
OU 600 µg	Sublinguale	Toutes les 3 heures avec un maximum de 3 doses OU Dose unique*

* Le misoprostol par voie sublinguale à la dose de 600 µg toutes les 3 heures avec un maximum de trois doses est un schéma d'administration recommandé ; on peut également administrer une dose sublinguale unique de 600 µg de misoprostol et laisser agir pendant une à deux semaines (sauf en cas de saignements abondants ou d'infection)

PRÉVENTION DES HÉMORRAGIES POSTPARTUM

Dose de misoprostol	Voie	Moment
600 µg	Orale	À administrer immédiatement après la naissance du bébé. Exclure la présence d'un second bébé (grossesse gémellaire) avant administration.

TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES POSTPARTUM (PERTE DE SANG \geq 500 ML)

Utiliser des oxytociques classiques plutôt que du misoprostol si disponibles

Dose de misoprostol	Voie	Moment
800 µg	Sublinguale	IMMÉDIATEMENT
OU 1000 µg	Rectale	IMMÉDIATEMENT

INDUCTION DE L'ACCOUCHEMENT

La prudence est de mise en cas d'antécédents de césarienne

Dose de misoprostol	Voie	Moment
25 µg	Vaginale	Toutes les 4 heures (avec un maximum de 6 doses et sous surveillance attentive)
OU 20 µg (dissoudre un comprimé à 200 µg dans un flacon de 200 ml d'eau propre ; administrer 20 ml par dose)	Orale	Toutes les 2 heures (avec un maximum de 12 doses et sous surveillance attentive). Bien agiter la solution dans le flacon avant chaque prise. Jeter le flacon après 24 heures.