

# GUIDE DE POCHE SUR LA CONTRACEPTION

Référence de poche à l'usage des cliniciens

MÉTHODE CONTRACEPTIVE	MOMENT OÙ LA MÉTHODE PEUT ÊTRE PROPOSÉE	REMARQUES
Préservatifs	Lors de la première visite	Peuvent être utilisés en tant que méthode intermédiaire pour les femmes qui ne sont pas prêtes à choisir immédiatement une méthode contraceptive ou pour celles qui ne peuvent pas commencer à utiliser la méthode de leur choix immédiatement après le traitement de l'avortement incomplet.
Contraceptifs injectables	Lors de la première visite	Peuvent être utilisés même en cas d'infection.
Contraceptifs oraux	Lors de la première visite	Peuvent être utilisés même en cas d'infection.
Dispositif intra-utérin (stérilet)	Lors de la visite de suivi	S'assurer de la réussite du traitement ; ne doit pas être utilisé en présence d'une infection active. Fournir des préservatifs ou une autre méthode provisoire jusqu'à la visite de suivi.

Implants contraceptifs	Envisager un réajustement en fonction de l'âge gestationnel.	Peuvent être utilisés même en cas d'infection.
Stérilisation	Lors de la visite de suivi	Fournir des préservatifs ou une autre méthode provisoire jusqu'à la visite de suivi.
Diaphragme	Lors de la première visite	Envisager un réajustement en fonction de l'âge gestationnel.
Gels contraceptifs, mousse contraceptive, comprimés contraceptifs ou films contraceptifs	Lors de la première visite	Peuvent être utilisés même en cas d'infection.
Dispositifs transdermiques	Lors de la première visite	Peuvent être utilisés même en cas d'infection.
Anneau vaginal	Lors de la première visite	Peuvent être utilisés même en cas d'infection.
Pilule contraceptive d'urgence	N'importe quand	Fournir à l'avance une pilule contraceptive d'urgence comme méthode de secours.