

ATENCIÓN AL ABORTO INFORMADA POR TRAUMA:

Estudio de casos clínicos para participantes

Estudio de caso clínico 1: Prestación de atención informada por trauma para sobrevivientes de violencia sexual que necesitan servicios de aborto o de anticoncepción

María es una refugiada de 17 años en el “Campo Imaginaria”, quien se casó a la edad de 13 años y tiene dos hijos menores de cinco años. Lleva tres años viviendo en el “Campo Imaginaria” con su esposo y sus hijos. En la sesión de consejería, ella le informa a usted que está embarazada pero no desea el embarazo. Ella no sabe la fecha de su última menstruación y no está segura de la edad gestacional de su embarazo. En general, se siente muy angustiada y agobiada, pero no especifica por qué.

María necesita un examen pélvico para determinar la edad gestacional de su embarazo y qué tipo de servicios usted le puede ofrecer. ¿Cómo desea usted proceder?

Estudio de caso clínico 2: Prestación de atención informada por trauma para sobrevivientes de violencia sexual que necesitan servicios de aborto o de anticoncepción

Maya es una refugiada de 22 años que vive con su esposo en el Campo de Refugiados Imaginaria. Maya fue referida a usted por una organización de apoyo psicosocial. Ella divulga que fue violada hace 14 semanas, teme estar embarazada y no sabe cuáles son sus opciones. No sabe cuál es la fecha de su última menstruación y no está segura de la edad gestacional de su embarazo.

Maya necesita un examen pélvico para determinar si está embarazada y qué tipo de servicios usted puede ofrecerle. ¿Cómo piensa usted proceder?

Estudio de caso clínico 3: Prestación de atención informada por trauma para sobrevivientes de violencia sexual que necesitan servicios de atención postaborto

Amina es una joven soltera de 17 años que vive en el Campo de Refugiados Imaginaria con sus tres hermanos menores. Tuvieron que huir de su hogar

a causa de combates cercanos y llevan muchos meses separados de sus padres. Hay mucho personal de mantenimiento de la paz estacionado alrededor del campo y Amina se hizo amiga de uno de ellos. Después de varias semanas de una relación amistosa casual, el hombre forzó a Amina a tener sexo con él en contra de su voluntad y ella quedó embarazada.

Amina acude al centro de salud; presenta un poco de sangrado vaginal y se siente febril y con malestar. Al examinarla, usted encuentra que tiene fiebre de 38°C y sensibilidad en el abdomen bajo, pero no presenta sensibilidad de rebote ni defensa peritoneal. Aunque tuvo su última menstruación hace 11 semanas, el tamaño de su útero es de aproximadamente 8 semanas. Además, ella informa que hace tres días se tragó algunas yerbas tradicionales y se puso dos tabletas en la vagina, que obtuvo de una mujer local.

Amina necesita una evaluación que incluya un examen pélvico para determinar qué tipo de servicios necesita y qué servicios usted puede proporcionarle. ¿Cómo piensa usted proceder?
