

SOINS D'AVORTEMENT TENANT COMPTE DES TRAUMATISMES :

Études de cas cliniques pour les participants

Étude de cas clinique 1 : Prestation de soins tenant compte des traumatismes aux survivantes de violences sexuelles ayant besoin de soins d'avortement ou de contraception.

Maria est une réfugiée de 17 ans au « Camp Imaginaria ». Elle a été mariée à l'âge de 13 ans et a deux enfants de moins de cinq ans. Elle vit au Camp Imaginaria avec son mari et ses enfants depuis trois ans. Lors de la séance de counseling, elle vous informe qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne veut pas l'être. Elle ne connaît pas la date de ses dernières règles et ne sait pas à quel stade de grossesse elle se trouve. Elle est globalement très déprimée et abattue, mais ne précise pas pourquoi.

Maria a besoin d'un examen pelvien pour déterminer l'âge de la grossesse et le type de services que vous pouvez lui offrir. Comment voulez-vous procéder ?

Étude de cas clinique 2 : Prestation de soins tenant compte des traumatismes aux survivantes de violences sexuelles ayant besoin de soins d'avortement ou de contraception.

Maya est une réfugiée de 22 ans qui vit avec son mari dans le camp de réfugiés Imaginaria. Elle vous a été adressée par une organisation de soutien psychosocial. Elle révèle avoir été violée il y a 14 semaines et craint d'être enceinte. Elle indique ne pas connaître ses options. Elle ne connaît pas la date de ses dernières règles et ne sait pas à quel stade de grossesse elle se trouve.

Maya a besoin d'un examen pelvien pour déterminer si elle est enceinte et quel type de services vous pouvez lui offrir. Comment comptez-vous procéder ?

Étude de cas clinique 3 : Prestation de soins tenant compte des traumatismes aux survivantes de violences sexuelles ayant besoin de soins après avortement

Amina est une jeune femme célibataire de 17 ans qui vit dans le camp de réfugiés Imaginaria avec ses trois jeunes frères et sœurs. Ils ont dû fuir leur maison en raison des combats à proximité, et sont séparés de leurs

parents depuis plusieurs mois. Il y a de nombreux casques bleus stationnés autour du camp et Amina s'est liée d'amitié avec l'un d'eux.

Après plusieurs semaines d'une relation amicale occasionnelle, l'homme a forcé Amina à avoir des rapports sexuels avec lui, et elle est tombée enceinte.

Amina se présente au centre de santé avec des saignements vaginaux et se sent fiévreuse et mal en point. À l'examen, vous constatez qu'elle a une fièvre de 38°C et que le bas-ventre est sensible, mais qu'il n'y a pas de sensibilité de rebond ni de défense abdominale. Bien que ses dernières règles remontent à 11 semaines, la taille de son utérus est d'environ 8 semaines. De plus, elle rapporte qu'il y a trois jours, elle a pris des herbes traditionnelles et mis deux pilules dans son vagin qu'elle a obtenu d'une femme locale.

Amina a besoin d'une évaluation comprenant un examen pelvien pour déterminer le type de services dont elle a besoin et ceux que vous pouvez lui fournir. Comment comptez-vous procéder ?
