

Aborto medicamentoso com mifepristona e misoprostol**ANTES DA 13.ª SEMANA DE GESTAÇÃO:**

- 200 mg de mifepristona por via oral
- 800 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou vaginal 1 ou 2 dias após mifepristona. A dose de misoprostol pode ser repetida para conseguir um aborto bem-sucedido.
- Após a 9.ª semanas de gestação, o uso rotineiro de pelo menos duas doses de misoprostol, administradas com 3-4 horas de intervalo, melhora as taxas de sucesso do aborto.

DURANTE OU APÓS A 13.ª SEMANA DE GESTAÇÃO (13.ª-24.ª SEMANA):

- 200 mg de mifepristona por via oral
- 400 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou vaginal 1 ou 2 dias após mifepristona. A dose de misoprostol deve ser repetida a cada três horas até a expulsão fetal e placentária.
- O tempo médio para o aborto é de 6-10 horas após o início do uso de misoprostol, embora algumas pessoas precisem de mais tempo para abortar com sucesso.

Aborto medicamentoso com misoprostol isolado**ANTES DA 13.ª SEMANA DE GESTAÇÃO:**

- 800 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou vaginal a cada três horas até a expulsão.
- Pessoas submetidas a aborto medicamentoso com misoprostol isolado fora de uma unidade sanitária devem receber 3-4 doses de misoprostol, dependendo do cenário.

DURANTE OU APÓS A 13.ª SEMANA DE GESTAÇÃO (13.ª-24.ª SEMANA):

- 400 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou vaginal de três em três horas até à expulsão fetal e placentária. A dose vaginal é mais eficaz do que as outras vias
- O tempo médio para o aborto é de 10-15 horas após o início do uso de misoprostol, embora algumas pessoas precisem de vários dias para conseguir um aborto bem-sucedido.

Tratamento médico para aborto incompleto, aborto retido ou morte fetal intra-uterina (cuidados pós-aborto)

TAMANHO UTERINO INFERIOR A 13 SEMANAS:

- Aborto incompleto
 - 600 mcg de misoprostol por via oral em dose única ou 400 mcg em dose única por via bucal, sublingual ou, na ausência de sangramento vaginal, por via vaginal.
- Aborto retido
 - 800 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou, na ausência de sangramento vaginal, por via vaginal a cada três horas até a expulsão (geralmente 1-3 doses)
 - Onde disponível, adicionar pré-tratamento com 200 mg de mifepristona por via oral 1 ou 2 dias antes de misoprostol

TAMANHO UTERINO DE 13 SEMANAS OU SUPERIOR:

- Aborto incompleto
 - 400 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou, na ausência de sangramento vaginal, por via vaginal a cada três horas até a expulsão
- Morte fetal intra-uterina (até a 24.ª semana):
 - 400 mcg de misoprostol por via bucal, sublingual ou, na ausência de sangramento vaginal, por via vaginal a cada 4-6 horas até a expulsão
 - Onde disponível, adicionar pré-tratamento com 200 mg de mifepristona por via oral 1-2 dias antes de misoprostol

Citação: Ipas. (2013). *Atualizações clínicas em saúde reprodutiva*.

PT www.ipas.org/AtualizacaoEsClinicas | **FR** www.ipas.org/ActualiteEsCliniques
ES www.ipas.org/ActualizacionEsClinicas | **EN** www.ipas.org/ClinicalUpdates